


原発性アルドステロン症検査②

様

副腎から「アルドステロン」というホルモンがたくさん出ている可能性があるので検査をして調べます。

	入院1日目	入院2日目	入院3日目	入院4日目	入院5日目
予定		ACTH負荷試験	フロセミド負荷試験	カプトリル負荷試験	デキサメサゾン検査
食事		朝食	朝絶食	朝絶食	
注意事項	* 検査前日の21時以降は絶食となります。(水のみ可)	* 検査前日の21時以降は絶食となります。(水のみ可) * 水は7時まで飲用できます。 * 検査中、気分が悪くなった場合ナースコールを押して看護師にお知らせください。	* 検査前日の21時以降は絶食となります。(水のみ可) * 水は7時まで飲用できます。 * 検査中、気分が悪くなった場合ナースコールを押して看護師にお知らせください。	* 検査前日の21時以降は絶食となります。(水のみ可) * 水は7時まで飲用できます。 * 検査中、気分が悪くなった場合ナースコールを押して看護師にお知らせください。	* 検査前日の21時以降は絶食となります。(水のみ可) * 水は7時まで飲用できます。
予定		<p>●8時30分までに排泄を済ませてその後、検査終了まで安静臥床で過ごしてください。</p> <p>□左右どちらかの腕の血管に注射用の針を留置します。</p> <p>9:00</p> <p>□留置した針から採血します。(1回目)</p> <p>□医師が留置した針から検査用の薬を投与します。</p> <p>9:30</p> <p>□看護師が留置した針から採血をします。(2回目)</p> <p>10:00</p> <p>□看護師が留置した針から採血をします。(3回目)</p> <p>検査終了です。</p>	<p>●8時30分までに排泄を済ませてその後、安静臥床で過ごしてください。</p> <p>□左右どちらかの腕の血管に注射用の針を留置します。</p> <p>9:00</p> <p>□血圧・脈拍測定</p> <p>□看護師が留置した針から採血をします。(1回目)</p> <p>□医師が留置した針から検査用の薬を投与します。以後2時間、立ったまま過ごしていただきます。(排泄時は座位可)</p> <p>10:00</p> <p>□血圧・脈拍測定</p> <p>□看護師が留置した針から採血をします。(2回目)</p> <p>11:00</p> <p>□血圧・脈拍測定</p> <p>□看護師が留置した針から採血をします。(3回目)</p> <p>検査終了です。</p>	<p>●8時30分までに排泄を済ませてその後、検査終了まで安静臥床で過ごしてください。</p> <p>□左右どちらかの腕の血管に注射用の針を留置します。</p> <p>9:00</p> <p>□検査のための薬を内服します。</p> <p>□内服直後に留置した針から採血をします。(1回目)</p> <p>9:30</p> <p>□内服30分後に採血をします。(2回目)</p> <p>10:00</p> <p>□内服60分後に採血をします。(3回目)</p> <p>10:30</p> <p>□内服90分後に採血をします。(4回目)</p> <p>11:00</p> <p>□内服120分後に採血をします。(5回目)</p> <p>検査終了です。</p> <p>23:00</p> <p>□翌日の検査のために薬を内服します。</p>	<p>●9時頃に採血をします。</p> <p>□朝食前に30分安静したあとの採血をします。</p> <p>□留置した針を抜きます。</p> <p>退院となります。</p> <p>次回受診日に検査結果を説明します。</p>
説明	入院オリエンテーション 検査に対する注意事項を説明します。		* ご不明な点・ご心配などは遠慮なくお尋ねください		
安静度	検査時以外は病院内フリー				
清潔	シャワー室は17時までとなっています。				



なお、患者様の状態に応じて予定が変更になる場合があります。ご不明な点がございましたら、お尋ねください。