

# ◎053016 : FOLFOXIRI+Bev

◎投与スケジュール

1コース

14日間

	薬剤名 (前投薬・抗癌剤)	レジメン量	投与時間	投与経路	投与日
1	生理食塩液	100mL	メイン ルート	点滴静注	day1
2	生理食塩液 パロノセトロン デキサメタゾン クロルフェニラミン	100mL 0.75mg 9.9mg 5mg	15分	点滴静注	day1
3	生理食塩液 <b>ベバシズマブ</b>	100mL 5mg/kg	90分 (2回目60分、 3回目以降30分 に短縮可能)	点滴静注	day1
4	ブドウ糖液5% <b>イリノテカン</b>	250mL 165mg/m <sup>2</sup>	1時間	点滴静注	day1
5	ブドウ糖液5% <b>オキサリプラチン</b>	250mL 85mg/m <sup>2</sup>	2時間 (同時に)	点滴静注	day1
	ブドウ糖液5% レボホリナート	250mL 200mg/m <sup>2</sup>		点滴静注	day1
6	生理食塩液 <b>フルオロウラシル</b> (持続静注)	100mL 3200mg/m <sup>2</sup>	48時間	点滴静注	day1~3にかけて

## 備考

8~12コース後、維持療法へ切り替える。