


ESWL(体外衝撃波破碎術)を受けられる患者さんへ

様

	入院当日(検査当日) 月 日()	退院日(翌日) 月 日()
目標	37℃以上の発熱がみられない 血尿がなく、排尿困難がみられない	予定どおり退院できる
安静度	病棟内フリー ※手術後の初回の歩行は看護師が付き添います	
食事	手術1時間後から飲水・食事ができます 水分をしっかり取るようにしてください 昼は絶食のため、食事は夕食からお出します(糖尿病の患者さんは医師に確認します)	
内服	中止中のお薬以外は継続となります	
排泄	手術後、初回排尿は観察させていただきます(初回の排尿は紙コップに取り、トイレの呼び出しボタンを押してください) 問題がなければ2回目以降の排尿は看護師に見せる必要はありません 出血があれば流さずナースコールでお知らせください 尿中の排石を確認するために、ストーンスクリーン(排石を取る容器)で尿をとるにとるようにお願いします	
注射	手術前より点滴の針を挿入し、点滴を開始します 手術後点滴があります (血尿がある場合は、止血剤入りの点滴が追加になる場合があります) 点滴終了後、翌日の回診まで点滴の針はそのまま留置しておきます	退院が決定すれば、針を抜きます
検査	手術の30分前に痛み止めの坐薬を使用します 手術後はレントゲンを撮り、車椅子で病室へ戻ります	朝食前に血液検査を行う場合があります 前日にお知らせします
観察	帰室時・手術1時間後に血圧・体温・脈拍・痛みなどを観察させていただきます 以後適宜測定させていただきます 手術後の血尿の有無、発熱等の感染徴候の有無について観察を行います	
説明	看護師が入院中の生活について説明します 薬剤師がお薬について説明します	平日は8時半頃に回診があります 回診後、退院が決まります 治療効果の説明は次回外来で行います 薬剤師より中止薬再開についての説明があります 水分(1日1.5~2L)摂取に努めてください

なお、患者様の状態に応じて予定が変更になる場合があります
ご不明な点がございましたら、お尋ねください

主治医()看護師()薬剤師()

北播磨総合医療センター 泌尿器科